


# КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19



**КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19** – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.

**Передача инфекции происходит** воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.

## ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:

- повышение температуры тела (чаще 38-39° С)
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)
- ощущение сдавленности в грудной клетке
- одышка
- мышечная и головная боль

Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.

## ПРОФИЛАКТИКА заражения и распространения респираторной вирусной инфекции:

- ✓ регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептическим средством;
- ✓ избегайте тесного контакта (менее 1 метра) с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- ✓ старайтесь не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- ✓ при кашле или чихании прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- ✓ воздержитесь от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.

**При появлении симптомов заболевания**, которые появились в течение 14 дней после возвращения из страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 (Китай, Республика Корея, Япония, Италия, Сингапур, Иран и др.) необходимо:

- остаться дома
- вызвать бригаду скорой медицинской помощи
- при вызове информировать медицинский персонал о странах пребывания и дате возвращения.

**КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19** – это острая респираторная вирусная инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания.



**Передача инфекции происходит** воздушно-капельным путём при чихании или кашле от одного человека к другому. Возможен контактно-бытовой путь передачи.

## **ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:**

- повышение температуры тела (чаще 38-39° С)
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)
- ощущение сдавленности в грудной клетке
- одышка
- мышечная и головная боль

Заболевание может начинаться также с появления жидкого стула, тошноты, рвоты, снижения аппетита.



## **ПРОФИЛАКТИКА заражения и распространения респираторной вирусной инфекции:**

- ✓ регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептическим средством;
- ✓ избегайте тесного контакта (менее 1 метра) с заболевшими людьми, у которых кашель или высокая температура тела;
- ✓ старайтесь не прикасаться немытыми руками к носу, рту и глазам;
- ✓ при кашле или чихании прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или согнутым локтем с последующим обязательным мытьём рук;
- ✓ воздержитесь от посещения мест большого скопления людей в период массовых заболеваний.



**При появлении симптомов заболевания,** которые появились в течение 14 дней после возвращения из страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 (Китай, Республика Корея, Япония, Италия, Сингапур, Иран и др.) необходимо:

- остаться дома
- вызвать бригаду скорой медицинской помощи
- при вызове информировать медицинский персонал о странах пребывания и дате возвращения.

